

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	
<b>Aceites de origen vegetal y animal</b>	
<b>Aceite de orégano (<i>Lippia graveolens</i>)</b> (equivalente a 4.474 g de i.a./L a 20°C)	0.50
<b>Aceites de menta (<i>Mentha piperita</i>)</b> (equivalente a 8.948 g de i.a./L a 20°C)	1.00
<b>Aceite de canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>)</b> (equivalente a 13.422 g de i.a./L a 20°C)	1.50
<b>Aceite de clavo (<i>Syzygium aromaticum</i>)</b> (equivalente a 8.948 g de i.a./L a 20°C)	1.00
<b>Aceite de soya (<i>Glycine max</i>)</b> (equivalente a 40.266 g de i.a./L a 20°C)	4.50
<b>Aceite de neem (<i>Azadirachta indica</i>)</b> (equivalente a 58.162 g de i.a./L a 20°C)	6.50
<b>Aceite de pescado (macarela)</b> (equivalente a 134.22 g de i.a./L a 20°C)	15.00
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Acondicionadores, Emulsificante, Estabilizador y Diluyentes	70.00
<b>TOTAL</b>	100.00

**RSCO-MEZC-INAC-1101Q-0680-096-30.0**
**OMRI. anm-18746**
**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.**
**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad indicada de Haku® y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Haku® es un líquido emulsionable, útil para el control de la plaga aquí indicada:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Zarzamora Fresa Arándano (0)	Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	1.25 - 1.50	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 5 días. Volumen de aplicación 200-300 L de agua/ha.

**( ):** Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** Una vez que la aspersión se ha secado.